核准日期：2011 年 12 月 26 日

修改日期：2023 年 09 月 08 日

云南白药痔疮膏说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

本品含草乌（制）；孕妇禁用；对本品过敏者禁用

【药品名称】

通用名称：云南白药痔疮膏

汉语拼音：Yunnan Baiyao Zhichuang Gao

【成份】国家保密方，本品含草乌（制），其余成份略。

【性状】本品为黄色至黄棕色软膏；有特殊气味。

【功能主治】化瘀止血，活血止痛，解毒消肿。用于内痔 I、II、III 期及其混合痔之便血、痔粘膜改变，炎性外痔之红肿及痔疮之肛门肿痛等。

【规格】每支装 1.5g。

【用法用量】用药前排便，清水清洗患部，外敷或纳肛，一次 1~1.5 克，一日 2 次，十天为一疗程。

【不良反应】上市后监测数据显示本品可见以下不良反应：皮疹、瘙痒、腹泻等。

【禁忌】1、孕妇禁用；2、对本品过敏者禁用。

【注意事项】

1. 用于外痔时，挤药膏直接涂敷患处；用于内痔时，将药膏软管的帽盖取下，导管插入肛门内，挤出药膏，弃去软管和帽盖；用于混合痔时，可先将药膏挤入肛门内，然后外敷。

2. 本包装应为一次性使用。

3. 使用时，请将包装内所附卫生护垫粘贴在内裤上，以免污染衣物。

4. 痔粘膜表面糜烂者初次使用时局部有烧灼不适感，数分钟后不适感减缓消失，再次用药不适感减轻，并逐渐消失。

5. 本品含草乌（制），请仔细阅读说明书并在医师指导下购买和使用。

6. 如果出现不良反应或疑似不良反应，应立即停用并彻底清洁用药部位，并去医院就诊。

7. 严格按药品说明书用法用量使用，不宜长时间使用。

8. 忌烟酒，忌食辛辣、油腻及刺激性食物。

9. 小儿、年老体弱者应在医师指导下使用。

10. 内痔出血过多或原因不明的便血应去医院就诊。

11. 过敏体质者慎用，运动员慎用。

12. 本品性状发生改变时禁止使用。

13. 请将本品放在儿童不能接触到的地方。

14. 儿童必须在成人的监护下使用。

15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

16. 本品只限于外用，切勿入口、眼、鼻，使用后即洗手。

17. 使用本药时，不宜同时服用含半夏、瓜蒌、瓜蒌子、瓜蒌皮、天花粉、川贝母、浙贝母、平贝母、伊贝母、湖北贝母、白蔹、白及或其制剂。

【药理毒理】药理学试验表明，本品可使二甲苯所致的小鼠耳廓肿胀减轻，使醋酸所致小鼠的扭体次数减少，使小鼠断尾出血时间缩短。在家兔肛门感染模型上，本品可减少溃疡形成面积，减少溃疡面的渗出及脓肿持续时间，可使感染性溃疡面的愈合期缩短。

【贮藏】密闭。

【包装】塑料管包装，每盒装云南白药痔疮膏 6 支，卫生护垫 6 片。

【有效期】36 个月

【执行标准】国家食品药品监督管理局国家药品标准 WS₃-484（Z-85）-2009Z

【批准文号】国药准字 Z20060003

【上市许可持有人及生产企业】云南白药集团股份有限公司

生产地址：云南省昆明市呈贡新区云南白药集团股份有限公司

邮政编码：650500

电话号码：4001000538

传真号码：0871-66226685

注册地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

网址：www.yunnanbaiyao.com.cn