

云南白药气雾剂说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用
孕妇禁用；酒精过敏者禁用；本品含草乌（制）、雪上一枝蒿（制）

【药品名称】

通用名称：云南白药气雾剂

汉语拼音：Yunnan Baiyao Qiwuji

【成份】国家保密方，本品含草乌（制）、雪上一枝蒿（制），其余成份略。

【性状】云南白药气雾剂为非定量阀门气雾剂，在耐压容器中的药液为淡黄色至黄棕色的液体；喷射时，有特异香气。云南白药气雾剂保险液为非定量阀门气雾剂，在耐压容器中的药液为黄色至黄棕色的液体；喷射时，有特异香气。

【功能主治】活血散瘀，消肿止痛。用于跌打损伤，瘀血肿痛，肌肉酸痛及风湿疼痛。

【规格】云南白药气雾剂每瓶装 50 克，含药液 38 克；云南白药气雾剂保险液每瓶装 60 克，含药液 28 克。

【用法用量】外用，喷于伤患处。使用云南白药气雾剂，一日 3～5 次。凡遇较重闭合性跌打损伤者，先喷云南白药气雾剂保险液，若剧烈疼痛仍不缓解，可间隔 1～2 分钟重复给药，一天使用不得超过 3 次。喷云南白药气雾剂保险液间隔 3 分钟后，再喷云南白药气雾剂。

【不良反应】上市后监测数据显示本品可见以下不良反应：皮疹、瘙痒、皮肤潮红等。

【禁忌】1、孕妇禁用。2、酒精过敏者禁用。3、对本品过敏者禁用。4、皮肤及黏膜破溃、化脓者禁用。5、禁止内服。

【注意事项】

- 1、本品只限于外用，切勿喷入口、眼、鼻，使用后即洗手。
- 2、如果出现不良反应或疑似不良反应，应立即停用，并去医院就诊。
- 3、小儿、年老体弱者、心脏病、溃疡病患者、经期妇女应在医师指导下使用。
- 4、使用云南白药气雾剂、保险液时先振摇，喷嘴离皮肤 5～10 厘米，喷射时间应限制在 3～5 秒钟，以防止局部冻伤。
- 5、皮肤过敏者停用。
- 6、皮肤受损者勿用。
- 7、本品含草乌（制）、雪上一枝蒿（制），请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用。
- 8、严格按药品说明书用法用量使用，不宜长时间、大面积使用。
- 9、本品自行用药宜在 7 天以内，如用药超过 7 天，应向医师咨询。
- 10、使用时勿近明火，切勿受热，应置于阴凉处保存。
- 11、使用本品后请勿按摩、揉搓。
- 12、使用及保存本品时请勿倒置。
- 13、本品含乙醇（酒精），用药期间不得与头孢菌素类（如头孢氨苄、头孢呋辛、头孢他啶等）、甲硝唑、替硝唑、酮康唑、呋喃唑酮等含甲硫四氮唑结构的药物联合使用，以免导致双硫仑样反应。
- 14、使用本药时，不宜同时服用半夏、瓜蒌、瓜蒌子、瓜蒌皮、天花粉、川贝母、浙贝母、平贝母、伊贝母、湖北贝母、白蔹、白及或其制剂。
- 15、对酒精及本品过敏者禁用，过敏体质者慎用，运动员慎用。
- 16、本品性状发生改变时禁止使用。
- 17、儿童必须在成人的监护下使用。
- 18、请将本品放在儿童不能接触的地方。
- 19、如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【贮藏】密封，置阴凉处。

【包装】铝罐包装，云南白药气雾剂 1 瓶；云南白药气雾剂保险液 1 瓶。

【有效期】36 个月

【执行标准】国家食品药品监督管理局标准 YBZ00122016

【批准文号】国药准字 Z53021107

【说明书修订日期】2024 年 04 月 02 日

【上市许可持有人及生产企业】云南白药集团股份有限公司

生产地址：云南省昆明市呈贡新区云南白药集团股份有限公司

邮政编码：650500

电话号码：4001000538

传真号码：0871-66226685

注册地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

网址：www.yunnanbaiyao.com.cn

如有问题可与生产企业联系