



# 氨咖黄敏片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

## 【药品名称】

通用名称：氨咖黄敏片

英文名称：Paracetamol, Caffeine, Artificial Cow-bezoar and Chlorphenamine Maleate Tablets

汉语拼音：An Ka Huang Min Pian

【成份】本品为复方制剂，每片含对乙酰氨基酚250毫克，咖啡因15毫克，马来酸氯苯那敏1毫克，人工牛黄10毫克。辅料为：玉米淀粉，糊精，蔗糖，羟丙甲纤维素，羧甲基淀粉钠，硬脂酸镁。

【性状】本品为淡黄色片。

【作用类别】本品为感冒用药类非处方药药品。

【适应症】适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

【规格】复方。

【用法用量】口服。成人，一次1~2片，一日3次。

## 【不良反应】

1. 有时有轻度头晕、乏力、恶心、上腹不适、口干、食欲缺乏等，可自行恢复。偶见粒细胞、血小板减少。

2. 偶见皮疹。有报道，极少数患者使用对乙酰氨基酚可能出现致命的、严重的皮肤不良反应。

3. 过量使用对乙酰氨基酚可引起严重肝损伤。

【禁忌】1. 严重肝肾功能不全者禁用。2. 对本品过敏者禁用。

## 【注意事项】

1. 用药3~7天，症状未缓解，请咨询医师或药师。

2. 服用本品期间不得饮酒或含有酒精的饮料。

3. 不能同时服用与本品成份相似的其他抗感冒药。

4. 前列腺肥大、青光眼等患者以及老年人应在医师指导下使用。

5. 肝、肾功能不全者慎用。

6. 孕妇及哺乳期妇女慎用。

7. 服药期间不得驾驶机动车、车、船、从事高空作业、机械作业及操作精密仪器。

8. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。

9. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

10. 本品性状发生改变时禁止使用。

11. 请将本品放在儿童不能接触的地方。

12. 当出现皮疹或过敏的其他征象时，如用药后出现瘙痒、皮疹，尤其出现口腔、眼、外生殖器红斑、糜烂等，应立即停药并咨询医生。

13. 因过量使用对乙酰氨基酚有引起严重肝损伤的报道，应严格按照说明书使用。用药期间如发现肝生化指标异常或出现全身乏力、食欲不振、厌油、恶心、上腹胀痛、尿黄、目黄、皮肤黄染等可能与肝损伤有关的临床表现时，应立即停药并就医。建议对乙酰氨基酚口服一日最大量不超过2克。

14. 应尽量避免合并使用含有对乙酰氨基酚或其他解热镇痛药的药品，以避免药物过量或导致毒性协同作用。

15. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

## 【药物相互作用】

1. 与其他解热镇痛药同用，可增加肾毒性的危险。

2. 本品不宜与氯霉素、巴比妥类（如苯巴比妥）等并用。

3. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】本品中对乙酰氨基酚能抑制前列腺素合成，有解热镇痛作用；咖啡因为中枢兴奋药，能增强对乙酰氨基酚的解热镇痛效果，并减轻其他药物所致的嗜睡、头晕等中枢抑制作用；马来酸氯苯那敏为抗组胺药，能减轻流涕、鼻塞、打喷嚏症状；人工牛黄具有解热、镇惊作用。

【贮藏】密封，在阴凉干燥处保存。

【包装】口服固体药用高密度聚乙烯瓶，100片/瓶。

【有效期】暂定24个月。

【执行标准】化学药品地方标准上升国家标准第三册WS-10001-（HD-0275）-2002

【批准文号】国药准字H53021684

【说明书修订日期】2024年10月24日

【上市许可持有人及生产企业】云南白药集团大理药业有限责任公司

生产地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区药物园区8号

邮政编码：671000

电话号码：4001000538

传真号码：0871-66226685

注册地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区药物园区8号

网 址：www.yunnanbaiyao.com.cn

如有问题可与生产企业联系



云南白药 集团大理药业有限责任公司  
YUNNAN BAIYAO GROUP DALI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

S281004