



国药准字H53021240

OTC
甲类

硫酸亚铁片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】

通用名称：硫酸亚铁片

英文名称：Ferrous Sulfate Tablets

汉语拼音：Liusuanyatie Pian

【成份】本品每片含硫酸亚铁0.3克（相当于铁60毫克）。辅料为：低取代羟丙纤维素、微晶纤维素、滑石粉、硬脂酸镁、蔗糖、虫白蜡、二甲硅油、红氧化铁、明胶。

【性状】本品为包衣片，除去包衣后显淡蓝绿色。

【作用类别】本品为矿物质类非处方药药品。

【适应症】用于各种原因（如慢性失血、营养不良、妊娠、儿童发育期等）引起的缺铁性贫血。

【规格】0.3克

【用法用量】口服，成人：预防用，一次1片，一日1次；治疗用，一次1片，一日3次。饭后服。

【不良反应】

1. 可见胃肠道不良反应，如恶心、呕吐、上腹疼痛、便秘。
2. 本品可减少肠蠕动，引起便秘，并排黑便。

【禁忌】

1. 肝肾功能严重损害，尤其是伴有未经治疗的尿路感染者禁用。
2. 铁负荷过高、血色病或含铁血黄素沉着症患者禁用。
3. 非缺铁性贫血（如地中海贫血）患者禁用。

【注意事项】

1. 用于日常补铁时，应采用预防量。
2. 治疗剂量不得长期使用，应在医师确诊为缺铁性贫血后使用，且治疗期间应定期检查血象和血清铁水平。
3. 酒精中毒、肝炎、急性感染、肠道炎症、胰腺炎等患者慎用；胃与十二指肠溃疡、溃疡性肠炎患者慎用。
4. 本品不应与浓茶同服。
5. 本品宜在饭后或饭时服用，以减轻胃部刺激。
6. 如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
7. 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8. 本品性状发生改变时禁止使用。
9. 请将本品放在儿童不能接触的地方。
10. 如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】

1. 维生素C与本品同服，有利于吸收。
2. 本品与磷酸盐类、四环素类及鞣酸等同服，可妨碍铁的吸收。
3. 本品可减少左旋多巴、卡比多巴、甲基多巴及喹诺酮类药物的吸收。
4. 如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】铁是红细胞中血红蛋白的组成元素。缺铁时，红细胞合成血红蛋白量减少，致使红细胞体积变小，携氧能力下降，形成缺铁性贫血，口服本品可补充铁元素，纠正缺铁性贫血。

【贮藏】密封，在干燥处保存。

【包装】口服固体药用高密度聚乙烯瓶，100片/瓶×1瓶/盒。

【有效期】24个月

【执行标准】《中国药典》2020年版二部

【批准文号】国药准字H53021240

【说明书修订日期】2024年10月21日

【上市许可持有人及生产企业】云南白药集团大理药业有限责任公司

生产地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区药物园区8号

邮政编码：671000

电话号码：4001000538

传真号码：0871-66226685

注册地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区药物园区8号

网 址：www.yunnanbaiyao.com.cn



云南白药

集团大理药业有限责任公司
YUNNAN BAIYAO GROUP DALI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

S411002