国药准字H53021240

OTC
甲类

硫酸亚铁片说明书

请仔细阅读说明书并按说明使用或在药师指导下购买和使用

【药品名称】
通用名称：硫酸亚铁片
英 文 名：Ferrous Sulfate Tablets
汉语拼音：Liusuanyatie Pian

【成　　份】本品每片含硫酸亚铁0.3克(相当于铁60毫克)。辅料为：低取代羟丙纤维素、微晶纤维素、滑石粉、硬脂酸镁、蔗糖、虫白蜡、二甲硅油、红氧化铁、明胶。

【性　　状】本品为包衣片，除去包衣后显淡蓝绿色。

【作用类别】本品为矿物质类非处方药药品。

【适 应 症】用于各种原因(如慢性失血、营养不良、妊娠、儿童发育期等)引起的缺铁性贫血。

【规　　格】0.3克

【用法用量】口服，成人：预防用，一次1片，一日1次；治疗用，一次1片，一日3次。饭后服。

【不良反应】
1.可见胃肠道不良反应，如恶心、呕吐、上腹疼痛、便秘。
2.本品可减少肠蠕动，引起便秘，并排黑便。

【禁　　忌】
1.肝肾功能严重损害，尤其是伴有未经治疗的尿路感染者禁用。
2.铁负荷过高、血色病或含铁血黄素沉着症患者禁用。
3.非缺铁性贫血(如地中海贫血)患者禁用。

【注意事项】
1.用于日常补铁时，应采用预防量。
2.治疗剂量不得长期使用，应在医师确诊为缺铁性贫血后使用，且治疗期间应定期检查血象和血清铁水平。
3.酒精中毒、肝炎、急性感染、肠道炎症、胰腺炎等患者慎用；胃与十二指肠溃疡、溃疡性肠炎患者慎用。
4.本品不应与浓茶同服。
5.本品宜在饭后或饭时服用，以减轻胃部刺激。
6.如服用过量或出现严重不良反应，应立即就医。
7.对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
8.本品性状发生改变时禁止使用。
9.请将本品放在儿童不能接触的地方。
10.如正在使用其他药品，使用本品前请咨询医师或药师。

【药物相互作用】
1.维生素C与本品同服，有利于吸收。
2.本品与磷酸盐类、四环素类及鞣酸等同服，可妨碍铁的吸收。
3.本品可减少左旋多巴、卡比多巴、甲基多巴及喹诺酮类药物的吸收。
4.如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

【药理作用】铁是红细胞中血红蛋白的组成元素。缺铁时，红细胞合成血红蛋白量减少，致使红细胞体积变小，携氧能力下降，形成缺铁性贫血，口服本品可补充铁元素，纠正缺铁性贫血。

【贮　　藏】密封，在干燥处保存。

【包　　装】口服固体药用高密度聚乙烯瓶，100片/瓶×1瓶/盒。

【有 效 期】24个月

【执行标准】《中国药典》2025年版二部

【批准文号】国药准字H53021240

【说明书修订日期】2025年10月01日

【上市许可持有人及生产企业】云南白药集团大理药业有限责任公司
生产地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区药物园区8号
邮政编码：671000
电话号码：4001000538
传真号码：0871-66226685
注册地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区药物园区8号
网　　址：www.yunnanbaiyao.com.cn
如有问题可与生产企业联系

云南白药 集团大理药业有限责任公司
YUNNAN BAIYAO GROUP DALI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.